

GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM

Compte rendu de la séance du 08/03/2007

Secrétaire : Dr Bonfils Frédéric

Modérateur : Dr Laborne Philippe

Temps 1 exemples :

- **Problèmes soulevés par le groupe**

- Dossier 1 : pas de problème.
- Dossier 2 : Indications et intérêts de l'Athymil dans les troubles du sommeil.
Semelles orthopédiques et genou.
- Dossier 3 : VS augmentée chez une personne agée.
- Dossier 4 : intérêt du test thérapeutique par anti-histaminiques dans une rhinite persistante. Efficacité des anti-histaminiques.
- Dossier 5 : pas de problème.
- Dossier 6 : conduite automobile et traitements anxiolytiques.
- Dossier 7 : pas de problème.
- Dossier 8 : Quel bilan systématique chez un adulte jeune asymptomatique.
- Dossier 9 : intérêt du vaccin contre le rotavirus.

Question 1 : Quels examens complémentaires sont à demander pour une VS élevée isolée chez un sujet âgé de plus de 70 ans asymptomatique ?

Question 2 : Quelle(s) information(s) et sous quelle(s) forme(s) par rapport à la conduite automobile, doit-on donner à un patient à qui on prescrit un traitement anxiolytiques ?

- **Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe**

- **Ecart(s) / à la pratique recommandée par l'HAS ...**

Temps 2

- **Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des soins**

Coronarographie par voie radiale : Hopital Ambroise Paré

Chirurgien cardio-vasculaire : Dr Goudot, clinique Ambroise Paré à Neuilly

Chirurgien vasculaire : Dr JeanMichel Coggia, hopital Ambroise Paré à Boulogne

Neurologue à Versailles : Dr D'Englejang

Hématologue : Dr Sylvie Castaigne, Hopital André Mignot.

Temps 3

- **synthèse des cas compliqués**

Essai thérapeutique non justifié et en dehors de tout protocole chez une femme présentant une DMLA

- **compte rendu des thèmes abordés au cours de la séance précédente**
- **autres...**

Réponses aux questions posées lors de la séance précédente :

1- Quels sont les risques de la prescription de l'Ibuprofène dans un contexte fébrile chez l'enfant ?

Enquête de la pharmaco-vigilance de l'Afssaps : « gare aux AINS chez l'enfant fébriles » de juillet 2004.

Mise au point sur la prise en charge de la fièvre chez l'enfant – Afssaps 04/01/2005

2 – Chez un patient traité pour une HTA mal équilibrée, sur quels critères de mesure doit-on envisager une modification du traitement ?

Avant de modifier un traitement anti-hypertenseur, on s'assure de la réalité de l'écart à l'objectif par au moins 3 mesures lors de 3 consultations espacées de un mois.

Efficacité et tolérance du traitement doivent être évaluées après 4 à 8 semaines sur plusieurs mesures étalées sur 2 ou 3 consultations.

3 – Coloscopie de dépistage pour antécédent de cancer du colon.

Anaes/recommandation professionnelles/2004 : 1ère coloscopie à partir de 45 ans ou 5 ans avant l'âge de diagnostic du cas index si antécédent au premier degré avant 60 ans ou si plusieurs cas de cancer colo-rectaux au premier degré quelque soit l'âge.