

GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM

Compte rendu de la séance du 19/12/2024

Secrétaire : Dr Dambor

Modérateur : Dr Dambor

1 - DOSSIERS PRESENTES PAR LE GROUPE :

Dossier 1 : Homme 52 ans, Trisomie 21, lumbago

Dossier 2 : Femme 36 ans, Migraine, Appareil dentaire

Dossier 3 : Homme 57 ans, Lombalgie aigue

Dossier 4 : Femme 93ans, démente, GIR 2, adressé par le SAS, toux

Dossier 5 : Femme 32 ans, Reprise de suivi gynécologique

Question(s) à traiter : Quels sont les éléments d'orientation diagnostique devant une hyper éosinophilie en ambulatoire ?

2 - REPONSES A LA QUESTION POSEE LORS DE LA SEANCE PRECEDENTE :

CAT diagnostique devant malaise

Recommandation HAS : ECG systématique même si malaise vagal

Drapeaux rouges : dyspnée et malaise durant une activité physique

Pas de recommandation de bio

Revue Médicale Suisse 2010 : mieux définir le malaise

-Perte de connaissance ?

-Signes neuro ?

-ATCD de cardiopathie ?

Si oui : >80% de probabilité que la cause soit d'origine cardiaque

Si non : probabilité d'une origine cardiaque <5%

ECG Systématique

3 - REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES APPORTEES PAR LE GROUPE :

Recommandations HAS et INCA pour le dépistage du Cancer du col de l'utérus :

Frottis à 25 – 26 et 29 ans (si décalage 3 frottis entre 25 et 30 ans)

Après 30 ans recherche de papillomavirus.

Si dernier examen = frottis, prochain test à 3 ans

Si dernier examen = recherche HPV, prochain test à 5 ans

Attention dépistage qui passe à côté des cancers glandulaires du col qui sont HPV négatifs (=5% des cancers du col)

Nouvelles recommandations vaccinales :

Pneumocoque :

Enfant = Vaxneuvance pour tous

Adulte = Prévenar 20 1 dose

- Si déjà eu Prevenar 13 → Prevenar 20 à 1 an
- Si schéma complet → Prévenar 20 à 5 ans

Méningocoque :

Bexsero qui devient obligatoire

Nimenrix (ACYW) à 6m et 12 mois en plus du bexsero et en remplacement du neisvac

Rattrapage chez les ados

Femme Enceinte :

Covid + Grippe

Bronchiolite : Abrysvo entre 32-36 SA si accouchement prévu durant la phase d'épidémie de bronchiolite/Beyfortus chez le nourrisson à la naissance en phase d'épidémie

Coqueluche : boostrix/repevax entre 20 et 36SA

Personnes Agées :

Abrysvo >75ans

4 - ECARTS PAR RAPPORT A LA PRATIQUE RECOMMANDÉE PAR HAS : ---

5 - SYNTHÈSE DES AMÉLIORATIONS PROPOSÉES DU PARCOURS ET DE LA COORDINATION DES SOINS :

6 - SYNTHÈSE DES CAS COMPLIQUÉS :

Femme de 66

Dyspnée progressive et apparition d'OMI des Membres puis du tronc avec aspect cartonné de la peau.

Hyperéosinophilie à 7000

Scanner thoracique normal

→ Maladie de Schulman/Fasciite à éosinophiles

7 - AUTRES QUESTION ET ECHANGES - DISCUSSION LIBRE :